



ЧТОБЫ ВАШ РЕБЁНОК НЕ ЗАБОЛЕЛ СВИНКОЙ — СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ!

www.vkdc.vladmedicina.ru
Клинико-диагностический центр г. Владивостока

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

☎ 8(423)226-38-11
📍 г. Владивосток,
ул. Светланская, 131

ГОРОДСКОЙ АЛЛЕРГО-
РЕСПИРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

☎ 8(423)263-93-54
📍 г. Владивосток,
ул. Спортивная, 10

ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ
ПСИХОТЕРАПИИ
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

☎ 8(423)240-15-62
📍 г. Владивосток,
ул. Уборевича, 22

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

☎ 8(423)222-28-23
📍 г. Владивосток,
ул. Светланская, 169/171

КГБУЗ «ВКДЦ»
КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

📍 ВЛАДИВОСТОК, УЛ. СВЕТАНСКАЯ, 131
✉ CMPVKDC@MAIL.RU ☎ 8(423)2-26-07-85

Подготовлено: врач КГБУЗ «ВКДЦ» Минеева Т.Н.
Согласовано: заведующая ЦВП ГАУЗ
«ККЦ СВМП» Воробьева Е.А.

04.09.2017г.



ПРИВЕЙТЕ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГБУЗ «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
КГБУЗ «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Эпидемический паротит (часто говорят – **свинка**) – это широко распространённая острая вирусная инфекция, при которой происходит воспаление слюнных желёз. Наиболее часто эпидемическим паротитом болеют дети в возрасте 5-15 лет, но могут заболеть и взрослые.

Заражение происходит воздушно-капельным путём (при разговоре, кашле, чихании) от больного человека. После попадания в организм, вирус размножается и поражает почти все железы организма, в первую очередь – околоушные и подчелюстные.

Больной свинкой заразен за 1-2 дня до появления первых признаков болезни и в течение 9 дней после её начала.

Заболевание начинается остро и протекает очень тяжело. Температура тела поднимается до 40° С, отмечается боль в ухе при открывании рта и жевании, повышается слюноотделение.

Паротит очень опасен осложнениями, так как может вызвать

поражение поджелудочной железы и центральной нервной системы. При осложненном течении могут развиваться воспаление яичка (у мальчиков) и воспаление яичников (у девочек), что приводит к нарушению детородной функции.

Чтобы застраховаться от неблагоприятного течения болезни, необходимо предупредить саму возможность развития ПАРОТИТА.

Для этого существует вакцина от эпидемического паротита, входящая в перечень обязательных прививок во всех странах мира.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, в России иммунизация против эпидемического паротита проводится в 12 месяцев и в 6 лет.

Эффективность вакцинации достаточно высока, с помощью нее обеспечивается долгий (возможно, пожизненный) иммунитет. В состав вакцин входит живой ослабленный вирус, безопасный для человека. Прививку против паротита

делают вместе с прививками против кори (ДИВАКЦИНА), а также и против краснухи (комбинированная тривакцина).

Наиболее часто регистрируемые нежелательные явления после введения вакцины могут возникнуть не раньше 4-го дня: повышение температуры тела, кожные высыпания, увеличение лимфатических узлов, инфекции верхних дыхательных путей. Все эти явления проходят самостоятельно и лечению не подлежат. В отдельных случаях отмечается кратковременное (не более 3-х дней) увеличение околоушных слюнных желёз.

Противопоказаниями к вакцинации против паротита являются иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови, онкологические заболевания, аллергия на перепелиные или куриные яйца.